

노로바이러스 발생 시 소독방법

가정 또는 시설에서 감염된 사람이 발생한 경우에 어떻게 해야 할까요?

설 연휴 가정에 친지들이 많이 모였을 때 감염되는 경우가 있을 수 있습니다.
구토물이나 분변에는 바이러스가 가득합니다. 깔끔하게 치우고 소독합시다!

1) 페트병을 이용하여 간단한 소독액을 만듭니다.

준비물

- 염소계 표백제
- 500ml 페트병(잘 씻고 건조한 병), 종이컵(180ml)
- 종이타월
- 쓰레기봉투(버리기 쉽도록 쓰레기통에 씌워놓기)
- 일회용 고무장갑
- 마스크 및 앞치마 등(감염방지용)



2) 구토물 또는 분변을 처리합니다(염소농도 4%표백제를 사용하는 경우).

① 0.1%(1000ppm)~0.5%(5000ppm)농도의 소독액을 만듭니다.

0.1%(종이컵 1/5컵분량) 또는 0.5%(종이컵 1/3컵분량)으로 염소계 표백제를 페트병에 붓습니다.

물을 더해 500ml로 채운 후 뚜껑을 닫아 잘 흔들어 섞습니다.



② 구토물이나 분변을 치워 비닐봉지에 담습니다.

소독액을 적신 종이타월로 구토물 등을 닦습니다.

닦아낸 면을 덮어가면서 담아 제거한 후 쓰레기봉투에 담습니다.



③ 구토물 등이 있던 곳과 주변을 소독합니다.

소독약을 적신 종이타월로 수 차례 닦은 후 물로도 수 차례 닦는다.

사용한 종이타월과 장갑도 쓰레기봉투에 담아 소독액을 뿌린 후 밀폐시켜 버린다.



3) 처리 후에는 비누를 이용하여 30초 이상 올바른 손씻기를 합니다.

가정 내 소독은 어떻게 해야 할까요?

❖ 0.1%(1,000ppm) 소독약을 만듭니다(염소농도 4%표백제를 사용하는 경우).
- 2ℓ (또는 2.5ℓ) 페트병+염소계 표백제 종이컵 1/3컵

| 소독할 장소 또는 물건 | 부위·종류 등 | 소독방법 |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| 화장실, 세면대, 욕실 | 대소변기, 배수용 레버, 손잡이, 수도꼭지, 욕조 | 세제 등으로 더러워진 곳을 닦은 후 묽은 소독액을 뿌린 후 10분 후에 물로 씻어낸다. |
| 구토물 또는 분변이 튼 장소, 더러워진 손으로 만든 장소 등 | 마루, 벽, 문손잡이, 전화기 등 | 묽은 소독액을 종이타월 등으로 문혀 닦고 10분 후에 물(깨끗한 물걸레)로 닦아낸다. |
| 구토물 또는 분변으로 더러워진 곳(잠옷, 속옷, 시트 등) | 잠옷, 속옷, 시트, 천 기저귀 등 | 더러워진 곳을 닦아 묽은 소독액에 30분 정도 담근 후 세탁한다. 젖은 수건을 대고 스팀 다리미로 85도, 1분 이상 가열하는 것도 효과 있음. |
| 구토물 또는 분변과 접촉한 물건 | 마스크, 앞치마, 종이타월 | 쓰레기봉투에 넣어 버린다. |

❖ 완료 후에는 비누를 이용하여 30초 이상 올바른 손씻기를 합니다.

