

A형간염 환자 주변환경 소독방법

소독이 필요한 곳	소독방법
환자가 있었던 장소	세제 등으로 더러워진 곳을 닦은 후 소독액(염소 2%, 20,000ppm)을 종이타올 등으로 묻혀 닦고 1분 후에 물(깨끗한 물걸레)로 씻어냄
화장실	
옷, 침구 등	더러워진 곳을 닦아 염소 소독액(염소 0.5%, 5,000ppm)에 30분 정도 담근 후 세탁
구토물, 분변	소독액(염소 2%, 20,000ppm)을 이용하여 키친타올, 걸레 등으로 닦아내면서 제거한 후 쓰레기봉투에 넣고 소독액을 뿌린 다음 버림

■ 소독 시 주의사항

- 장갑, 마스크, 앞치마를 착용 후 소독 실시
- 소독을 할 때는 창문을 연 상태(외부 공기와 접촉 상태)에서 실시하고 소독 후에도 충분히 환기
- 소독액은 가연성 물질에 가까이 두지 말고, 희석하여 사용 후에는 소독 효과가 떨어지므로 보관하지 말고 버릴 것
- 소독 후에는 반드시 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손씻기

페트병을 이용하여 간단한 소독액 만들기

■ 준비물

- 염소계 표백제(예: 락스)
- 500ml 페트병(잘 씻고 건조한 병)
- 종이컵(180ml)
- 일회용 고무장갑
- 마스크 및 앞치마



■ 필요 염소농도 만들기

- 염소 2%(20,000ppm) : 빈 생수통 500ml에 절반은 염소, 절반은 수돗물을 섞음
- 염소 0.5%(5,000ppm) : 빈 생수통 500ml에 종이컵 1/3의 염소를 붓고 나머지에 수돗물 섞음

빈 생수통 절반 또는 종이컵 1/3의 염소를 페트병에 붓습니다.

염소가 들어간 생수통에 물을 더해 500ml로 채운 후 뚜껑을 닦아 잘 섞은 후 사용합니다.

