

수두, 수두,

예방이 중요합니다!

4-6세, 초등학교 저학년 중심으로 많이 발생
4월~6월, 11월~1월에 환자 발생 증가



· 증상 ·



권태감, 미열

가려움증을 동반한
물집이 몸통, 두피,
얼굴에 발생

딱지가 생기며
회복

· 전파경로 ·



수두 환자가
기침이나
재채기를 할 때

수두 환자와
직접 접촉할 때

※ 예방접종을 받은 어린이는 증상이 매우 가볍게 나타날 수 있음
※ 의심증상이 보이면 즉시 마스크를 착용하고 의료기관 방문

· 예방수칙 ·

예방접종

- 만 12세 이하는 전국 보건소 및 지정 의료기관에서 무료로 예방접종 가능

구 분	대 상
정기 접종	생후 12~15개월 소아
★ 따라잡기 접종	수두에 대한 면역이 없고 정기접종 시기에 접종 받지 못한 소아 만 13세 미만 : 1회 접종 만 13세 이상* : 4-8주 간격으로 2회 접종

*만 13세 이상은 유료 접종

올바른 손씻기 및 개인위생관리

- 손 씻을 땀 비누로 흐르는 물에 30초 이상
- 기침·가래 등으로 오염된 물건은 소독하여 사용

전파기간 동안 등원·등교하지 않기

- 모든 물집에 딱지가 앉을 때까지 격리