

# 말라리아 감염 전파를 줄이기 위해서는 빠른 진단과 치료가 중요합니다.

## 임상증상



+

권태감과 서서히 증가하는 발열이 수일간 지속됨  
오한, 발열, 발한 후 해열이 반복적으로 나타남  
두통이나 구역, 설사 등 동반 할 수 있음

## 위험지역에서 모기물린 후


말라리아 위험지역 거주나 방문, 유행국가 방문 이력과 모기에 물리고(혈액내 원충이 관찰) 7~14일 이후

=

**말라리아를 의심해보세요.**

# 말라리아 간이 검사 2019년 9월 1일부터 보험급여 적용

★말라리아 감염 의심 시 신속진단키트(Rapid Diagnostic Test : RDT)를 활용해보세요. (추정진단)



\* 확진 위해 확진진단까지 반드시 시행 (현미경검사 또는 유전자 검출 검사)

# 말라리아 환자 가이드

## 의료기관용

### 확인

- 발열환자 진료 시 다음사항을 꼭 확인
  - 말라리아 위험지역(인천, 경기, 강원 북부) 거주나 방문력 확인
  - 해외 말라리아 유행국가 및 지역 등 확인
- \* 질병관리본부 홈페이지(www.cdc.go.kr) 및 콜센터 1339 확인

### 검사

- 말라리아 신속진단키트(RDT) 검사 실시(추정진단)
- 확인검사\*(현미경검사, 유전자 검출검사) 반드시 실시
  - \* 확인검사 의뢰 시 질병관리본부 매개체분석과 의뢰(043-719-8525), 검체안전운송시스템을 통해 송부 (현) 녹십자 랩셀 수거(1566-0131)
  - \* 의료기관 자체 확인검사 하더라도 완치조사 위해 확인검사 의뢰방법과 동일하게 질병관리본부에 혈액검체 송부

### 신고

- 신속진단검사 양성시 지체없이 감염병 발생신고(의사환자)
- 확인진단검사 양성 시 지체없이 감염병 발생(환자) 및 병원체 신고
  - \* 감염병통합관리정보지원시스템 <http://is1.cdc.go.kr>

### 치료

- 국내 삼일열 말라리아: 클로퀸 3일과 프리마퀸 14일 처방(용량 확인)
  - \* 프리마퀸 투여 전 G6PD검사 실시
- 해외유입 말라리아: 해당국가의 항말라리아제 내성확인 후 치료제 선택
  - \* 2019년 말라리아 진료가이드 참조

### 설명

- 말라리아 위험국가 여행 시 말라리아 예방약 복용 안내
- 항말라리아약 복용 철저 및 약 복용 중 구토 등 부작용 의심 시 진료
- 모기에 물리지 않도록 예방수칙 준수
  - \* 모기기피제, 모기향, 밝은색 긴팔과 긴바지 착용 등
- 치료 완료 1개월 후 보건소에서 완치조사 받도록 안내

