


코로나19 예방접종(노바백스 백신) 이후 이상반응 안내문



☑ 노바백스 백신 안내

접종 대상 18세 이상 미접종자

접종 간격 노바백스 백신으로 1차 접종 후 21일(3주)에 2차 접종을 실시
(식품의약품안전처 허가사항)

교차 접종 대상자

· mRNA 백신(화이자 백신, 모더나 백신) 또는 바이러스벡터 백신(아스트라제네카 백신, 얀센백신)의 접종 금기 대상자이거나 접종 연기 대상자에 해당하는 경우, 의사의 소견에 따라 노바백스 백신으로 2차 또는 3차 접종 가능

※ Polysorbate 80 성분에 아나필락시스(중증 알레르기 반응) 발생 이력이 있는 경우는 노바백스 백신 접종 금기대상자임

노바백스 백신 접종 이후 어떤 이상반응이 생길 수 있나요?

주로 발생하는 증상

- ▶ 접종부위 통증 또는 압통
- ▶ 근육통 또는 관절통
- ▶ 피로
- ▶ 두통
- ▶ 권태감(평상시와 다른 저조한 건강상태)

발생 가능한 증상

- ▶ 접종 부위 발적 또는 종창
- ▶ 오심 또는 구토
- ▶ 발열

※ 위와 같은 이상반응 증상은 대부분 경증으로 하루 또는 이틀 안에 사라집니다.

- 접종부위 부기, 통증이 있는 경우, 깨끗한 마른 수건을 대고 냉찜질하세요.
- 발열이나 근육통 등으로 가벼운 불편함이 있는 경우에는 해열진통제를 복용하세요.

☑ 다음과 같은 증상이 있을 경우에는 진료를 받으세요

- 접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상증상이 나타날 경우
- 접종 후 2일이 지난 후에도 증상이 호전되지 않을 경우

드물게 중증 알레르기 반응인 아나필락시스가 발생할 수 있습니다.

- 호흡곤란, 천명, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등의 심한 알레르기 증상이 있을 경우에는 **119로 연락**하거나, **응급실** 진료를 받으세요.

※ 향후 추가적인 이상반응 정보가 확인될 경우 안내하도록 하겠습니다.

☑ 이상 반응 신고는 어떻게 하나요?

이상반응을 진료한 의료기관의 의사, 치과의사, 한의사가 진단 후 관할 보건소장에 신고하게 됩니다. 만약, 접종 받은자(보호자)가 직접 신고를 희망할 경우에는 예방접종도우미 누리집(<http://nip.kdca.go.kr>)을 통하여 신고할 수 있습니다.



※ 코로나19 예방접종에 대한 추가적인 정보는 질병관리청 코로나19 예방접종도우미 누리집(<http://ncv.kdca.go.kr>)이나 1339에 문의해 주세요.