

우리 아이 감기 증상, 혹시?

- 호흡기세포융합바이러스 감염증(RSV) -





밤낮 기온차가 큰 요즘에는 **면역력이 떨어져**
바이러스에 노출되기 쉽습니다.


특히 **면역력이 약한 아이들의 경우**에는 더욱
건강에 신경을 써야 합니다. 이 시기 영유아에게서 많이 나타나는
호흡기세포융합바이러스 감염증! 자세히 알아보까요?!

호흡기세포융합바이러스 감염증

(RSV, Respiratory Syncytial Virus)이란?

2021년 12월 RSV 감염자 통계

(출처: 질병관리청)



호흡기세포융합바이러스에 의해 발생하는
급성호흡기감염증을 말합니다.

매년 10월부터 다음 해 3월까지 유행하며,
모든 소아가 만 3세 이전에
적어도 한 번 이상 감염될 수 있습니다.

호흡기세포융합바이러스 감염증의 주요 증상은?



기침



콧물



재채기



발열



주의



**호흡곤란,
모세기관지염, 폐렴**

영유아에서 발병 초기에 **발열, 기침, 콧물 등 감기 증상**으로 시작해서 코막힘, 쌉쌉거림 증상이 발생하고, 심한 경우 **모세기관지염, 폐렴 등 하기도 감염**으로 진행될 수 있습니다. 보호자들은 아이들이 **유행시기마다 재감염** 될 수 있으므로 유심히 살펴보셔야 합니다.

호흡기세포융합바이러스 감염증은 어떻게 감염이 될까?



직접적인 접촉



기침, 재채기

호흡기세포융합바이러스는 **감염된 사람과의 접촉이나 기침, 재채기 등으로 감염**이 됩니다. 잠복기가 2~8일 정도로 짧고, 전파력이 강해 면역력이 약한 영유아의 경우 **집단감염이 발생**하는 경우가 많습니다. 따라서 산후조리원, 영유아 보육시설 등에서는 각별히 주의가 필요합니다.

호흡기세포융합바이러스 감염증은 어떻게 치료할까?



호흡기세포융합바이러스 **감염증은 대증요법**으로
치료가 가능한 경우가 대부분이기 때문에
증상에 따라 수액 공급, 해열제 투약 등 **대증치료**를 합니다.
하지만, 폐렴이나 모세기관지염 등으로
발전된 경우에는 입원치료가 필요합니다.

호흡기세포융합바이러스 감염증은 어떻게 예방할 수 있을까?



올바른 손씻기 및 기침예절 실천



씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



호흡기 증상이 있는 사람과 접촉 피하기



신생아나 영유아와 접촉 전·후 반드시 손씻기



장난감, 식기, 수건 등 물품 개별 사용

**겨울철에 유행하는
호흡기세포융합바이러스 감염증,
철저한 예방과 관리로
우리 아이 건강을 지켜주세요!**

